

宁夏贺兰山东麓葡萄与葡萄酒联合会

简 报

第 15 期

宁夏贺兰山东麓葡萄与葡萄酒联合会秘书处

2025 年 8 月 8 日

近期葡萄病虫害防治技术要点

近一月，我区雨水偏多，葡萄霜霉病、灰霉病、酸腐病等病害在贺兰山东麓产区各酿酒葡萄园已经开始发生，据天气预报，8月-9月我区降水仍将偏多，后期病害防治压力较大，为做好葡萄采收前病害防治工作，提出以下防控措施，请各酒庄结合自己实际情况进行防治。

一、农业防治措施

1. 中耕除草，降低田间湿度

地势低洼的葡萄园，及时清理园内排水沟渠，确保雨后积水排出，并及时对行间进行中耕松土，增强土壤透气性，及时防除葡萄园行内杂草，降低田间湿度。

2. 合理修剪，改善通风透光

疏除过密枝、病弱枝、交叉枝，尤其是结果母枝基部的冗余枝条和“厂字型”一道丝以下的枝条，确保架面通风透光，减少郁闭环境；及时摘除果穗周围的叶片（尤其内堂叶片），使果穗通风透光，降低果穗湿度。

二、药剂防治措施

1. 距上次施药时间超过 10 天的葡萄园，喷施一次 24%吡唑醚菌酯悬浮剂 1300-2000 倍液或 60%啞菌酯 1500-2000 倍液混配 40%啖酰·咯菌腈悬浮剂 1000-2000 倍或 70%咯菌腈水分散粒剂 2500-4500 倍并添加 0.1%有机硅，进行全园喷施，尤其保证果穗上能喷到药。

2. 西拉、黑比诺、霞多丽等品种在上述药剂的基础上再混配 25%吡丙·噻嗪酮悬浮剂 1500-2500 倍液或 30%吡丙·呋虫胺悬浮剂或 30%吡丙·虫螨腈悬浮剂 2000-3000 倍进行全园喷施。

三、注意事项

1. 监测预警：关注天气变化，加强病虫害监测，密切注意病害发生发展情况，如果后期出现连阴雨，要做好提前采收准备。

2. 用药时间：选择晴天上午 9-11 点（露水干后）或下午 4 点后喷药。

3. 安全间隔期：严格遵守药剂安全间隔期，酿酒葡萄采收前 20-30 天停止用药确保葡萄酒质量安全。

报送：宁夏贺兰山东麓葡萄与葡萄酒联合会会员、产区各酒庄企业

宁夏贺兰山东麓葡萄与葡萄酒联合会秘书处

2025 年 8 月 8 日印发
